

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff(e)	Indikation(en)	l bzw. kg je m Kronenhöhe bzw. % bzw. Stück	Maximale Aufwandmenge in kg (l) / ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendung in der Kultur	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung (Zul.zeitraum)	Kultur (Steinobst)	Wartefrist in Tagen
----------	--------------------	--------------	----------------	---	--	---------------------	---	--	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------	---------------------



Zulässige Insektizide und Akarizide (inkl. Schäl- und Nageschutz)

1739/0	Austriebsspritzmittel 7 E	Paraffinöl (830g/l)	Spinnmilben (Wintereier)	10	30	Knospenschwellen bis Mausohrstadium	1	1	---	31.12.2022	Steinobst	---
2633/0 bzw. 2633/904 und weitere	Austriebsspritzmittel Promanal Neu bzw. biohelp Promanal	Paraffinöl (546 g/l)	Schildläuse (überw. Stadien), Spinnmilben (Wintereier)	10	30	Knospenschwellen bis Knospenaufbruch	1	1	---	31.12.2022	SO	---
2622/902	Biohelp Neudosan	Anwendung siehe Neudosan Neu Blattlausfrei 2622/0										
3431/901 3431/1	Florbac	Anwendung siehe XenTari 3431/0 u.a.										
2961/0	Isomate C/OFM	Codlemone, Tetradecanol, Dodecanol, Dodecen	Apfelwickler, Kleiner Fruchtwickler	---	1000 Stk.	unmittelbar vor Beginn Falterflug	1	---	---	31.10.2027	SO	---
3001/0	Isomate CLR	Codlemone, Dodecanol, Tetradecanol, Tetradecen	Apfelwickler, Schalenwickler	---	1000 Stk.			---	---	31.03.2026		---
3002/0	Isomate OFM Rosso flex	Dodecen-Acetat	Kleiner Fruchtwickler, Pflaumenwickler	---	500 Stk.			---	---	---		---
396/0	Kumulus WG	Schwefel	Gallmilben	1,5	4,5	Grüne Spitze bis Ballonstadium und Nachblütefruchtfall bis Triebwachstum abgeschl.	2	5	10	30.09.2024	Pläumen (Zwetschen)	---
						Grüne Spitze bis Ballonstadium					Pfirsich, Marille	---
3657/0	Lepinox plus	Bacillus thuringiensis	Pfirsichmotte und Wickler zur Befallsminderung	0,33	1	Ab Beginn Larvenschlupf	3	3	7	30.04.2022	SO	---
3809/0	Madex Twin	Apfelwickler- Granulosevirus	Pfirsichwickler	0,05	0,1	Ab Beginn Larvenschlupf	6	6	6	30.04.2022	SO	---
2568/902	Micula	Anwendung siehe Schädlingfrei Obst und Gemüse Konzentrat 2568/0										
2699/0 2699/2 2699/907	NeemAzal-T/S bzw. Neem Bio Schädlingfrei	Azadirachtin	Frostspanner (weitere Indikationen bei 2699/0 siehe Notfallzulassung)	1,5	4,5	Befallsbeginn bis Blühbeginn	1	1	---	31.12.2023	SO	---



Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff(e)	Indikation(en)	l bzw. kg je m Kronenhöhe bzw. % bzw. Stück	Maximale Aufwandmenge in kg (l) / ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendung in der Kultur	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung (Zul.zeitraum)	Kultur (Steinobst)	Wartezeit in Tagen
2622/0 2622/903	Neudosan Neu Blattlausfrei bzw. Neudosan Neu	Kali-Seife	Spinnmilben, Saugende Insekten, ausgen. Blutlaus	10	30	Bei Befallsbeginn	5	5	7	--	SO	--
3354/0	Para Sommer	Paraffinöl (654g/l)	Spinnmilben (ab Wintererier)	15	45	Mausohrstadium bis Ballonstadium	1	1 (Paraffinöl max. 1x/Jahr)	---	31.12.2021	SO	--
1739/901	Promanal HP	Anwendung siehe Austriebsspritzmittel 7E 1739/0										
2633/903 2633/902	Promanal Neu Austriebsspritzmittel/ Promanal Neu Schild- und Wollausfrei/uw.	Anwendung siehe Austriebsspritzmittel Promanal Neu 2633/0										
3878/0	RAK 3+4	Codlemone + Tetradecylacetat	Fruchtschalenwickler		500 Stk.	unmittelbar vor Beginn Falterflug	1	---	---	31.08.2021	Kirsche	--
2568/0	Schädlingsfrei Obst und Gemüse Konzentrat	Pflanzenöl (Rapsöl; 777 g/l)	Obstbaumspeckmilbe (Rote Spinne), Spinnmilben	10	---	bei Befallsbeginn	2	2	7	31.08.2022	SO	--
			Gallmilben				3	3			SO	
			Schwarze Kirschenblattlaus								Kirsche	
			Schildlausarten								Plausen (Zwetschken)	
3141/0 3141/903	Spruzit Schädlingsfrei/ Spruzit progress	Pyrethrine + Rapsöl	saugende und beißende Insekten	3,5	10,5	Bei Befallsbeginn	2	---	5	---	Kirsche	3
saugende Insekten, Schmetterlingsraupen, ausgen. Pflaumenwickler	Zwetschke/ Pflaume											
3364/0	Wöbra	Quarzsand	Schälschutz gegen Wild	---	0,4 kg/ Stamm	ganzjährig	1	1	---	31.12.2026	Obstgehölze	--
			Schäl- und Nageschutz gegen Feldhase, etc.	---	0,25 kg/ Stamm		1	1				
3431/0 u.a.	XenTari	Bacillus thuringiensis	Freifressende Schmetterlingsraupen	0,5	1,5	ab Blühbeginn, ab Larvenstadium L1	2	2	10	30.04.2022	SO	8



Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff(e)	Indikation(en)	l bzw. kg je m Kronenhöhe bzw. % bzw. Stück	Maximale Aufwandmenge in kg (l) / ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendung in der Kultur	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung (Zul.zeitraum)	Kultur (Steinobst)	Wartefrist in Tagen
----------	--------------------	--------------	----------------	---	--	---------------------	---	--	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------	---------------------

Zulässige Fungizide und Bakterizide

238/0	Cosan-Super Kolloid-Netzschwefel	Schwefel	Echter Mehltau zur Befalls-minderung	2,5	7,5	Grüne Spitze bis fortgeschrittene Fruchtausfärbung	14	14	7	31.03.2026	Pfirsich/ Nektarine, Marille, Pflaume/Zw.	7	
3034/901 3034/0 u.a.	Cuprofor flow/Flowbrix	Kupferoxychlorid (380 g Reincu)	Schrotschusskrankheit	1,1	3,3	vor der Blüte (bis Knospen-aufbruch), nach der Ernte	4	4 (in Summe max. 4 kg Rein-kupfer)***	7	---	Pflaumen/ Zw., Marille, Kirsche/Wei., Pfirsich	---	
			Pfirsichkräuselkrankheit								Pfirsich		
				Marille									
2097/0	Cuproxat flüssig	Kupfersulfat (190 g Reincu)	Pfirsichkräuselkrankheit	0,87	2,6	Knospenschwellen	4	4 (in Summe max. 4 kg Rein-kupfer)	14	---	Pfirsich/ Nektarine	---	
											Marille		
3405/0 3405/901	Cuprozin progress/ Cupravit	Kupferhydroxid (250 g Reincu)	Pilzliche Blattfleckenerreger	1,4	4,2	bis Ballonstadium und nach der Ernte	3	3 (in Summe max. 4 kg Rein-kupfer)***	7	31.12.2021	SO	---	
			Ast- und Baumsterben zur Befalls-minderung			bis Ballonstadium und nach der Ernte							
			Bakterienbrand			vor der Blüte bis Ballonstadium und nach der Ernte							
			Pfirsichkräuselkrankheit			Vegetationsruhe-Ballonstadium							Marille/ Pfirsich
			Taschenkrankheit										Pflaumen/ Zwetschke
			Bakterienbrand Streichenanwendung!		4 (0,8 %)	Vorblüte und nach der Ernte					SO		
			3404/0 3404/901	Funguran progress/ Cumatol	Kupferhydroxid (350 g Reincu)	Pilzliche Blattfleckenerreger	1	3	bis Ballonstadium	3	3 (in Summe max. 4 kg Rein-kupfer)***	7	---
nach der Ernte													



Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff(e)	Indikation(en)	l bzw. kg je m Kronenhöhe bzw. % bzw. Stück	Maximale Aufwandmenge in kg (l) / ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendung in der Kultur	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung (Zul.zeitraum)	Kultur (Steinobst)	Wartezeit in Tagen
3399/0	Kumar	Kaliumhydrogen- karbonat	Monilia-Spitzendürre	1,5	4,5	Blühbeginn bis Beginn Fruchtreife	6	6	8	31.12.2023	Marille	1
			Blütenmonilia, Monilia- Spitzendürre, Monilia- Fruchtfäule								Kirsche Pflaumen/ Zwetschke Pfirsich	
2162/0	Kupferol	Kupfersulfat (190 g Reincu)	Pfirsichkräuselerkrankung	0,87	2,6	Beginn Knospenschwellen (Blattknospen) bis Knospenschwellen (Blüten)	4	4 (in Summe max. 4 kg Rein- kupfer)	14	Aufbrauch 10.06.2021	Pfirsich/ Nektarine Marille	---
3701/0	Microthiol WG	Schwefel	Echter Mehltau zur Befalls- minderung	2,5	7,5	Grüne Spitze bis fortgeschrittene Fruchtausfärbung	14	14	7	31.12.2022	Pfirsich, Nektarine, Marille, Pflaume/Zw.	7
1941/0	Netzschwefel Kwizda	Schwefel	Echter Mehltau zur Befalls- minderung	2,5	7,5	Grüne Spitze bis fortgeschrittene Fruchtreife	14	14	7	31.03.2026	Pfirsich/ Nektarine, Marille, Pflaume/Zw.	7
3680/0	Prestop	Gliocladium catenulatum	Blütenmonilia	0,66	2	Ballonstadium bis Blühende	4	4	3		SO	28
3578/901	Sanax	Anwendung siehe Vitisan 3578/0										
3536/0	Serenade ASO	Bacillus subtilis	Monilia-Fruchtfäule, Blütenmonilia, Botrytis	2,7	8	Knospenschwellen bis fortgeschr. Fruchtausfärbung	6	6	5	30.04.2022	SO	---
2632/0	Thiovit Jet	Schwefel	Echter Mehltau, Schrotschusskrankheit	2,7	7,5	erste Laubblätter spreizen sich ab bis fortgeschr. Fruchtausfärbung	10	10	7	31.07.2024	Süßkirsche, Weichsel, Marille, Pflaume/Zw. Pfirsich, Nektarine	7
3578/0 3578/1	Vitisan	Kaliumhydrogen- karbonat	Schrotschusskrankheit	2,5	7,5	Blühbeginn bis fortgeschr. Fruchtausfärbung	6	6	3	31.08.2022	SO	---
			Echter Mehltau	3,34	10 (max. 45 kg/ha)							

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff(e)	Indikation(en)	l bzw. kg je m Kronenhöhe bzw. % bzw. Stück	Maximale Aufwandmenge in kg (l) / ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendung in der Kultur	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung (Zulassungszeitraum)	Kultur (Steinobst)	Wartefrist in Tagen
----------	--------------------	--------------	----------------	---	--	---------------------	---	--	--------------------------------	--	--------------------	---------------------



Grundstoffe - Beispielliste (siehe auch BMK Seite 94)

Mögliche Grundstoffe in Lebensmittelliste! (genauere Infos zur Zubereitung siehe link im BMK, Seite 94)	Ackerschachtelhalm	Pfirsichkräuselkrankheit	---	200 g getr. Kraut für Auszug	Knospenaufbrauch bis Blühende	---	2-6	7	KEIN Zulassungsende vorhanden	Pfirsich	---
	Brennnessel	Pfirsichblattlaus, Schwarze Kirschenlaus,...	---	15 g/l getr. bzw. 75 g/l frisches Kraut	Frühjahr bis Fruchtreife	---	1-5	7		Pflaume/Zw., Pfirsich, Kirsche	7
	Calciumhydroxid (Kalkwasser)	Obstbaumkrebs u.a. Krankheiten	63 l bzw. 45 l bzw. 15 kg	104 l (24%) bzw. 76 l (33,12%) bzw. 25 kg	Blattfall; Ende Okt.-Ende Dez. Sprühapplikation!	---	2-7 (max. 175 kg/ha)	5-14		SO	---
			---	450 l	Winter bis März Streichen auf Schnittwunden!	1-2	2	21			---
	Weidenrinde	Pfirsichkräuselkrankheit	---	200 g Weiden- rinde	Frühjahr bis Sichtbarwerden der ersten Blütenblätter	---	2-6	7		Pfirsich	---

Notfallzulassungen (Artikel 53)

4244/0	Curatio	Schwefelkalk	Schrotschusskrankheit	2,7	8	ab Knospenaufbruch	8	11	5	16.04.- 13.08.2021	SO	21
			Pfirsichkräuselkrankheit				3			15.02.- 14.06.2021	Pfirsich/ Nektarine, Marille	
			Echter Mehltau				3			15.02.- 14.06.2021	SO	
			Bakterienbrand (Pseudomonas)			ab Knospenaufbruch	3			15.02.- 15.04.2021	SO	
						nach der Ernte (Triebwachstum abgeschlossen)				14.08.- 12.10.2021		



Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff(e)	Indikation(en)	l bzw. kg je m Kronenhöhe bzw. % bzw. Stück	Maximale Aufwandmenge in kg (l) / ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendung in der Kultur	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung (Zulassungszeitraum)	Kultur (Steinobst)	Wartezeit in Tagen
2699/0	NeemAzal-T/S	Azadirachtin	Blattläuse, Frostspanner	1,5	4,5	Befallsbeginn-Blühende	3	3	7	05.03.- 29.05.2021	SO	--
3380/0	Piretro Verde	Pyrethrine	Kirschessigfliege	1,2	2,4	bei Befallsbeginn	3	3 (max. mit diesem Wirkstoff!)	7	01.05.- 28.08.2021	Kirsche, Weichsel	3
										Marille		
			1.06.- 28.9.2021			Pfirsich, Nektarine						
			12.03.- 30.04.2021			Marille						
										1.04.- 31.05.2021	Pfirsich, Nektarine	
Brauner Lappenrüssler, Kirschkernstecher	Blühende bis 50% sortentyp. Fruchtgröße											
4252/0	Quassia-Extrakt MD	Quassia-Extrakt	Sägewespe	6 g	12 g/ha Wirkstoff	abgehende Blüte bis Blühende	1-(2)	2	2	01.03.- 28.06.2021	SO	--
3296/0	Spintor	Spinosad	Kirschessigfliege	0,1	0,3	nach der Blüte, nach Flughöhepunkt (Falle)	2	2	7	01.05.- 28.08.2021	Kirsche, Weichsel	3
										Marille		
										01.06.- 28.09.2021	Pfirsich Zwetschke/ Pflaume	
3141/0	Spruzit Schädlingfrei	Pyrethrine + Rapsöl	Rüsselkäfer (ausgen. Steinobstknospenstecher)	3,5	10,5	Blühende bis 50% sortentyp. Fruchtgröße	2	2 (max. mit diesem Wirkstoff!)	5	17.03.- 31.05.2021	Marille	7
											Pfirsich, Nektarine	

Hinweise:	rot unterlegte Produkte	PSM, die unbedingt im Laufe des Jahres 2021 aufgebraucht werden müssen!!! Diese Produkte stehen nicht mehr im aktuellen BMK, aber im PSM-register der Ages.
	orange unterlegte Produkte	PSM, wo die Zulassung 2021 ausläuft, die aber noch abverkauft bzw. im Laufe des Jahres 2022 noch aufgebraucht werden können; in den meisten Fällen werden diese Produkte auch häufig von den Firmen weiter verlängert; trotzdem nicht mehr als notwendig von diesen Produkten einkaufen!!!
	Neue Produkte	Diese Produkte sind zum Teil bereits im BMK bzw. in einer eigenen Nachmeldungsliste auf www.infoxgen.com unter Bio-Betriebsmittel/Anmeldung von Produkten/ Pflanzenschutz,.../ Nachmeldungen zu finden!
	***	Bei diesen Kupferprodukten kann die Anzahl der Anwendungen erhöht werden, wenn die Dosierung reduziert wird und insgesamt nicht mehr als 4 kg Reinkupfer pro Kultur/ha und Saison ausgebracht werden. Der Abstand zwischen den Anwendungen ist dann auch hinfällig! (BIO AUSTRIA- und Handelseinschränkungen beachten!!!)